

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Davilose 5 mg/ml Colírio, solução
Hipromelose

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é Davilose e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Davilose
3. Como utilizar Davilose
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Davilose
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O QUE É DAVILOSE E PARA QUE É UTILIZADO

Grupo farmacoterapêutico: 15.6.1 - Medicamentos usados em afeções oculares. Outros medicamentos e produtos usados em oftalmologia. Adstringentes, lubrificantes e lágrimas artificiais.

Davilose, colírio, solução, está indicado:

- Na hiposecreção conjuntival;
- Na irritação ocular de duração inferior a três dias.

2. O QUE PRECISA DE SABER ANTES DE UTILIZAR DAVILOSE

Não utilize Davilose

- Se tem alergia (hipersensibilidade) à substância ativa ou a qualquer outro componente de Davilose.

Tome especial cuidado com Davilose

- Este medicamento contém cloreto de benzalcónio. Pode causar irritação ocular.
- Evitar o contacto com lentes de contacto moles.
- Remover as lentes de contacto antes da aplicação e esperar pelo menos 15 minutos antes de as recolocar.
- Passível de descolorar lentes de contacto moles.

Outros medicamentos e Davilose

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Gravidez e amamentação

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

No caso de ocorrer turvação da visão, não conduza nem utilize máquinas enquanto esta persistir.

Davilose contém cloreto de benzalcónio

Pode causar irritação ocular.

Evitar o contacto com lentes de contacto moles.

Remover as lentes de contacto antes da aplicação e esperar pelo menos 15 minutos antes de as recolocar.

Passível de descolorar lentes de contacto moles.

3. COMO UTILIZAR DAVILOSE

Uso oftálmico.

Utilizar Davilose sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Como média, recomenda-se a aplicação de uma gota de Davilose, colírio, solução, três vezes ao dia, podendo a frequência da aplicação ser mais elevada.

Se utilizar mais Davilose do que deveria

Não foram observados casos de sobredosagem.

Caso se tenha esquecido de utilizar Davilose

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar. No caso de se esquecer de uma dose, administre-a assim que se lembrar e, continue o tratamento de acordo com o estabelecido. Em caso de dúvidas, deverá contactar o seu médico assistente ou farmacêutico.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, Davilose pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Poderá ocorrer turvação visual devido à viscosidade da solução.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED I.P. através dos contactos abaixo:

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. COMO CONSERVAR DAVILOSE

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Não utilizar para além de 28 dias após a abertura do frasco conta-gotas.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize Davilose após o prazo de validade impresso no rótulo do frasco conta-gotas e na embalagem exterior. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não utilize Davilose se verificar sinais visíveis de deterioração.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.

Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita.

Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. CONTEÚDA DA EMBALAGEM E OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Davilose

-A substância ativa é a hipromelose. Cada mililitro de colírio, solução contém 5 mg de hipromelose.

-Os outros componentes são: fosfato dissódico di-hidratado, fosfato monossódico mono-hidratado, cloreto de sódio, cloreto de benzalcónio, ácido clorídrico (para ajuste do pH), hidróxido de sódio (para ajuste do pH) e água purificada.

Qual o aspetto de Davilose e conteúdo da embalagem

Davilose apresenta-se na forma farmacêutica de colírio, solução. Corresponde a uma solução oftálmica estéril, límpida, incolor e isenta de partículas em suspensão, acondicionada em frasco conta-gotas de LDPE com tampa de HDPE. Embalagem com um frasco com 10 ml de colírio, solução.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

DAVI II - Farmacêutica, S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso, nº 69 B
Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena
Portugal
Tel: 214 340 000
Fax: 214 340 099
E-mail: geral@davi.pt

Fabricante

Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.
Rua Norberto de Oliveira, 1 - 5
2620-111 Póvoa de Santo Adrião
Portugal

Este folheto foi revisto pela última vez em 09/2018